

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne


 Ministère de l'Agriculture
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

 62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : (26) 09.06.43

 PUBLICATION PÉRIODIQUE
 Abonnement annuel : F

ÉDITION SPÉCIALISÉE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

- 1 -

BULLETIN N° 14 du 23 MAI 1985

Envoi n° 13

ABONNEMENT ANNUEL :

 Edition A ou B : 125 F
 Edition A + B : 225 F

<u>COLZA</u>	: AGIR	. cylindrosporiose
	SURVEILLER	charançon des siliques
	ATTENDRE	alternaria
<u>POIS</u>	: SURVEILLER	mildiou
<u>POMME de TERRE</u>	: AGIR	. MILDIOU
<u>CEREALES</u>	: AGIR	. traitements fongicides
		. cnéphasie

COLZA

La cylindrosporiose est toujours en évolution.

SUR LES PARCELLES NON PROTÉGÉES DEPUIS PLUS D'UN MOIS, RÉALISEZ RAPIDEMENT UNE INTERVENTION SI LA MALADIE EST INSTALLÉE SUR LES FEUILLES SUPÉRIEURES.

Les charançons des siliques sont assez peu actifs mais de nouveaux vols ont eu lieu localement.

N'oubliez pas que la chute des pétales réduit la durée d'action des insecticides (5 jours de rémanence environ).

EN CAS DE REINFESTATION, UN TRAITEMENT DE BORDURE PEUT ÊTRE RÉALISÉ.

ATTENTION AUX ABEILLES.

L'alternaria est faiblement présente sur les feuilles de la base.

IL EST ENCORE TROP TÔT POUR TRAITER.

Stratégie de lutte :

La période d'intervention s'étale du stade "10 premières siliques bosselées" jusqu'à 3 semaines avant récolte.

Le traitement doit être déclenché dès l'apparition des premières taches sur siliques avec :

Kidan à 1,5-2 l/ha
 Rovral à 0,75-1 l/ha
 Sumisclex à 1,5 l/ha

POIS

Dans quelques rares parcelles, le mildiou est bien implanté. Ce champignon est cependant défavorisé par les températures actuelles.

LES PREMIÈRES TACHES D'ANTHRACNOSE SONT SIGNALÉES. LES AVERSES AYANT LESSIVÉ LES PRODUITS DE CONTACT, UNE NOUVELLE COUVERTURE POURRA ÊTRE RÉALISÉE EN CAS DE PRÉSENCE MARQUÉE DE MILDIOU. TENEZ COMPTE DE LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE D'ANTHRACNOSE POUR CHOISIR VOS PRODUITS.

POMME DE TERRE

Les premières taches de mildiou ont été observées le 20 mai sur tas de déchets (secteur de Nozay, Villers-Herbisse dans l'Aube).

P.1...114

Les conditions orageuses actuelles sont très favorables aux contaminations.

PROTEGER DES QUE POSSIBLE L'ENSEMBLE DES CULTURES LEVEES. EN RAISON DU RISQUE ELEVE DE LESSIVAGE, PRE-FEREZ LES PRODUITS PENETRANTS OU SYSTEMIQUES.

Résistance aux fongicides systémiques :

Afin de limiter ou d'éviter l'apparition de souches de mildiou résistantes, nous vous conseillons :

- d'éviter toute utilisation de l'Acylon P dans les zones à résistance.
- dans les régions sans résistance connue :
 - . n'intervenez que sur végétation active, au maximum 2 fois au cours de la campagne pour l'Acylon P, 2 à 3 fois pour le Pulsan.
 - . n'intervenez que sur culture saine, c'est à dire en PREVENTIF.

CEREALES

Blé : gonflement à sortie dernière feuille pour les plus précoces.

Orge-escourgeon : épiaison

Blé :

Septoriose, oïdium et fusariose en évolution. Le piétin évolue rapidement dans la tige, mais reste stable en fréquence.

Les premières pustules de rouille brune sont signalées dans le Nogentais.

LES PARCELLES AYANT DEJA RECU UNE BONNE COUVERTURE CONTRE LES MALADIES FOLIAIRES NE DEVRAIENT PAS ETRE PROTEGEES AVANT L'EPIAISON, SEULES LES CULTURES INSUFFISAMMENT PROTEGEES CONTRE L'OÏDIUM, LA SEPTORIOSE OU LA ROUILLE BRUNE SONT A TRAITER SI LA 3ème FEUILLE EST ATTEINTE.

Orge-Escourgeon :

LA PROTECTION "EPIAISON" EST A REALISER RAPIDEMENT SI LE DERNIER TRAITEMENT REMONTE A PLUS DE 3 SEMAINES, NOTAMMENT SI L'HELMINTHOSPORIOSE EST BIEN IMPLANTEE.

Orge de printemps :

Oïdium, plus rarement rhynchosporiose sont présents.

DANS LES PARCELLES PRECOSES, INTERVENEZ EN CAS DE PASSAGE SUR LA 3ème FEUILLE.

Cnéphasie :

Des insectes au stade "pincement" sont signalés localement.

VISITER VOS PARCELLES SITUEES EN BORDURE DE BOIS OU DE HAIES.

INTERVENEZ RAPIDEMENT SI LE SEUIL EST ATTEINT.

A PARTIR DU 1er JUIN, NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCE TELEPHONIQUE

Pour améliorer la qualité des services que nous vous proposons, des permanences téléphoniques seront assurées :

- le lundi de 9 h 30 à 12 h 00
- le mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 9 h 00
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

à TROYES : 16 (25) 73.25.23

à REIMS : 16 (26) 09.06.43

DIFFUSION TELEMATIQUE DES AVERTISSEMENTS AGRICOLES

La diffusion par Minitel des avertissements agricoles permet de mettre très rapidement à votre disposition une information constamment à jour : le délai entre l'envoi et la réception du message est de quelques minutes, et plusieurs messages peuvent être envoyés chaque semaine.

Actuellement, 2 cultures sont concernées : la vigne et la pomme de terre. Les autres cultures bénéficieront de ce système dès le mois de septembre prochain.

Pour connaître les conditions d'abonnement, contactez notre Service.